



Asociación de
Neumología y
Cirugía Torácica
del **Sur**

Hoy se ha inaugurado en La Línea de la Concepción el XXXVII Congreso Neumosur, que reúne a más de 200 neumólogos de Andalucía y Extremadura

NEUMÓLOGOS ADVIERTEN QUE LA MEDIA DE FUMADORES DIARIOS SIGUE SIN DISMINUIR EN ANDALUCÍA Y ES MAYOR QUE LA DEL CONJUNTO DEL TERRITORIO NACIONAL

El número de personas que fuman a diario ha crecido llamativamente en Granada, y de forma significativa en Almería, Huelva y Málaga, mientras que ha descendido ligeramente en Sevilla y Córdoba y de forma más importante en Cádiz y Jaén

La prevalencia de consumo de tabaco en Andalucía es del 31,1% mientras que en España es del 29,5%, y todas las provincias andaluzas, salvo Cádiz, se sitúan por encima de la media nacional

Además, el número de personas que han dejado de fumar en Andalucía ha descendido casi un punto, y este descenso recae sobre todo en las mujeres, a las que no se ha logrado motivar suficientemente para que abandonen el tabaco.

Los neumólogos indican que los datos son concluyentes y dejan poco margen a la autocomplacencia y piden mayores recursos públicos para combatir el tabaquismo, que es la causa directa del 14,6% de muertes en nuestra Comunidad, una quinta parte de las muertes que se producen en el territorio nacional por este motivo.

Valoran positivamente los esfuerzos realizados con la implementación del PITA (Plan Integral del Tabaquismo en Andalucía) y la puesta en marcha del Proceso de Atención a las Personas Fumadoras, pero, a la vista de los datos, los consideran insuficientes y piden un abordaje del tabaquismo específico para las mujeres.

Confían, no obstante, en que la reciente entrada en vigor de la nueva Ley antitabaco, con la consiguiente prohibición total de fumar en los espacios públicos, permita corregir esta tendencia, tal y como ha ocurrido en otros países.

La Línea de la Concepción, 24 de marzo de 2011.- La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur, sociedad científica que agrupa a más de 550 neumólogos y cirujanos torácicos de Andalucía y Extremadura, ha expresado hoy, en la inauguración de su 37º Congreso, que se celebra en La Línea de la Concepción (Cádiz), su preocupación por la evolución de la media de fumadores diarios en Andalucía, que sigue sin disminuir y se sitúa además por encima de la media nacional. Según los datos que aporta la Encuesta Andaluza de Salud de 2007, pese a la entrada en vigor de la Ley

Antitabaco 28/2005, la prevalencia de consumo de tabaco en Andalucía se ha mantenido en el mismo 31,1% de 2003 (que eran los últimos datos disponibles). En España, la media es del 29,5%, y todas las provincias andaluzas, salvo Cádiz, se sitúan por encima de la media nacional.

La evolución es especialmente preocupante en Granada, Almería, Huelva y Málaga, donde el número de fumadores diarios no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado significativamente, especialmente en la primera de estas provincias, donde ha pasado del 28,88% al 33,78%. Los descensos en el número de fumadores se han producido en Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén, siendo no demasiado importantes en los dos primeros casos y más notables en los dos segundos, donde se ha pasado del 32,63% al 28,63% en Cádiz y del 37,03% al 32,09% en Jaén. Esa evolución en los últimos cuatro años convierte a Granada, con el citado 33,78% en la provincia andaluza con mayor número de fumadores, seguida inmediatamente por Huelva, con un 33,6%. Cádiz es, con el 28,63% la provincia andaluza con menos fumadores y, como se ha dicho, la única por debajo de la media nacional. (ver tabla 1).

Además, el número de personas que han dejado de fumar en Andalucía ha descendido casi un punto, del 14,3% al 14,4% y este descenso recae sobre todo en las mujeres, a las que no se ha logrado motivar suficientemente para que abandonen el tabaco. Así, en Almería, Cádiz, Granada y Málaga han dejado de fumar en 2007 menos personas que en 2003, y en todas estas provincias este descenso recae sobre todo en el sector femenino. Esta falta de motivación de la mujer para dejar de fumar se ve especialmente en Málaga, donde el porcentaje de mujeres que dejan de fumar decrece en estos cuatro años más de cinco puntos, del 10,4% en 2003 al 5,3% en 2007. Del mismo modo, en las provincias donde el número de ex fumadores sí ha aumentado, se observa un comportamiento completamente diferenciado entre hombres y mujeres.

Datos concluyentes

Los expertos de Neumosur han manifestado que los datos son concluyentes y dejan poco margen a la autocomplacencia y han solicitado mayores recursos públicos para combatir el tabaquismo, que es la causa directa del 14,6% de muertes en nuestra Comunidad, una quinta parte de las muertes que se producen en el territorio nacional por este motivo. Alrededor de 10.000 personas mueren anualmente en nuestra Comunidad como consecuencia directa del tabaco.

Los neumólogos andaluces valoran positivamente los esfuerzos realizados en Andalucía con la implementación del PITA y la puesta en marcha del Proceso Asistencial de atención a las personas fumadoras, pero, a la vista de los datos, los consideran insuficientes y piden un abordaje del tabaquismo diferenciado por sexos, con programas específicos para hombres y mujeres. Confían, no obstante, en que la nueva ley antitabaco 42/2010, con la consiguiente prohibición total de fumar en los espacios públicos, permita corregir esta tendencia, tal y como ha ocurrido en otros países, y esperan que las próximas encuestas muestren ya un descenso significativo en el número de fumadores y un crecimiento tanto de los hombres como de las mujeres que han dado el paso al frente y han dejado de fumar.

37º Congreso Neumosur

Además de los resultados sobre tabaquismo, el 37º Congreso de Neumosur someterá a debate desde hoy hasta el sábado los últimos resultados e investigaciones en campos como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el cáncer de pulmón, el asma, las enfermedades respiratorias ocupacionales, el tabaquismo o la tuberculosis. En 2010, las enfermedades respiratorias se situaron en nuestro país como segunda causa de muerte. Mientras que las enfermedades isquémicas del corazón causaron 35.888 defunciones, el cáncer de pulmón y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores sumaron 35.052 muertos.

Asimismo, este Encuentro, la cita anual más importante de la Neumología en el sur de España, acogerá por primera vez el Symposim Internacional ALAT-SPP-Neumosur en el que especialistas de la Sociedad Latinoamericana del Tórax (ALAT), Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) y Neumosur abordarán la situación actual del tabaquismo y analizarán las políticas de prevención en Latinoamérica, Portugal, Andalucía y Extremadura. Este XXXVII Congreso Neumosur también acogerá el 1er Taller de Terapia inhalada dirigida a médicos de Atención Primaria y que se realiza dentro del marco de relaciones institucionales con Sociedades de Médicos de Atención Primaria Andaluzas como son SAMFyC, SEMERGEN-Andalucía y SEMG-Andalucía.

	2003			2007		
	Hombre %	Mujer %	Total %	Hombre %	Mujer %	Total %
Almería	20,7	11,6	16,2	18,1	7,3	13,0
Cádiz	16,5	5,6	10,9	23,2	5,2	13,9
Córdoba	21,5	6,5	13,8	20,6	4,2	12,1
Granada	30,2	10,7	20,2	21,3	10,2	15,5
Huelva	18,5	4,6	11,4	20,4	13,6	17,1
Jaén	18,5	7,0	12,6	19,5	6,7	13,1
Málaga	25,0	10,4	17,5	15,6	5,3	10,3
Sevilla	18,9	5,8	12,2	19,2	9,8	14,4
Total	21,2	7,7	14,3	19,5	7,5	13,4

Tabla 1. Fumadores a diario por sexo y provincia (EAS 2003-2007)

	2003			2007		
	Hombre %	Mujer %	Total %	Hombre %	Mujer %	Total %
Almería	42,02	17,79	30,01	38,75	24,49	31,98
Cádiz	38,88	26,61	32,63	35,70	24,04	28,63
Córdoba	43,95	23,60	33,45	43,87	22,69	32,87
Granada	37,31	20,94	28,88	43,09	25,00	33,78
Huelva	35,57	26,49	30,95	40,29	26,77	33,66
Jaén	50,37	24,21	37,03	43,61	20,74	32,09
Málaga	33,65	21,15	27,22	36,79	23,67	30,11
Sevilla	39,46	23,51	31,25	38,45	21,74	30,05
Total	39,47	23,12	31,10	39,36	23,05	31,10

Tabla 2. Exfumadores por sexo y provincia (EAS 2003-2007)

**Para más información, contactar con Manuela Hernández/Rocío Fernández.
Gabinete de Prensa de Neumosur. 954 62 27 27/ 651 86 72 78**