


FACTORIA DE FICCIÓN siempre en directo
 siempre en 

Unas 7.500 personas en España padecen fibrosis pulmonar idiopática

EUROPA PRESS • 27/02/2018 - 18:55



Masimo
MightySat™
 Disponible en [Apple.es](#)
[COMPRAR AHORA](#)



MightySat™
 Disponible en [Apple.es](#)
[COMPRAR AHORA](#)

PUBLICIDAD

Actualmente, el número de nuevos casos anuales de la FPI se sitúa entre el 4,6 y el 7,4 por cada 100.000 habitantes, y su frecuencia en la población general entre el 13 por cada 100.000 en mujeres y el 20 por cada 100.000 en varones. Aunque es considerada una enfermedad rara, el número de casos diagnosticados muestra tendencia al alza en los últimos años, posiblemente por la optimización de los métodos diagnósticos y el aumento de la esperanza de vida.

No obstante, todavía la FPI tiene una alta mortalidad, incluso superior a los cánceres más comunes, cuya supervivencia a los cinco años oscila entre el 20 y el 40 por ciento. Además, su curso natural es impredecible y variable, pero lo más frecuente es que sea progresiva, de forma lenta y llevando a los pacientes a una insuficiencia respiratoria.

Dado que la disnea y la tos seca son síntomas inespecíficos, habitualmente se suele pensar en otras patologías más comunes, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma e insuficiencia cardíaca, retrasando en el diagnóstico, lo que hace que se retarde el acceso a las consultas de respiratorio, y, por ende, a las consultas monográficas de esta enfermedad.

"Ahora que disponemos de dos antifibróticos, los neumólogos tenemos que trabajar junto a los médicos de atención primaria, para que sospechen esta enfermedad y nos deriven a los pacientes de manera precoz. Así pueden beneficiarse de los tratamientos en un estadio todavía leve o moderado, preservar el volumen y la función pulmonar y tener mejor calidad de vida, aumentando también la supervivencia", ha dicho la doctora Romero.

Por todo ello, prosigue, diagnosticar FPI es "difícil" porque el 38 por ciento de los pacientes consulta de media tres o más médicos antes de ser diagnosticado correctamente, y casi el 55 por ciento de ellos tuvieron un retraso de un año o más entre los síntomas respiratorios y el diagnóstico de FPI.


"Lo primero que tenemos que hacer es sospecharla y la pista clave está en la auscultación respiratoria al apreciarse la existencia de unos sonidos típicos llamados crepitantes inspiratorios secos en las bases del pulmón, sonidos respiratorios que nos van a hacer pensar que estamos ante esta enfermedad. Otra pista clave es la edad, ya que la FPI no es frecuente en pacientes menores de 50 años, y principalmente, varones fumadores o exfumadores", ha añadido la experta.

Comentar 

PUBLICIDAD

Te Recomendamos

Enlaces Promovidos por Taboola 



Top 10 Mejor Antivirus 2018 - Elija la mejor # 1 protección!
Antivirus Top 10



Conoce solteras cerca de Madrid
Meele



Millones de personas aprenden un nuevo idioma con la app creada por Babbel
Babbel



Ganga para Madrid: vuelos baratos desde 14€ ida y vuelta
www.jetcost.es



El extraño entretenimiento de una joven en un baño público que arrasa en la Red




La hábil maniobra de un médico para ayudar a un bebé en su nacimiento


PUBLICIDAD


 NUEVO SEAT LEÓN 1.4 TGI

 SOLO POR


 NUEVO SEAT LEÓN 1.4 TGI



 NUEVO SEAT LEÓN 1.4 TGI


 NUEVO SEAT LEÓN 1.4 TGI



¡YA A LA VENTA!
 Unidades limitadas
LA QUE SE AVECINA



¡YA A LA VENTA!
 Unidades limitadas
LA QUE SE AVECINA



¡YA A LA VENTA!
 Unidades limitadas
LA QUE SE AVECINA



¡YA A LA VENTA!
 Unidades limitadas
LA QUE SE AVECINA





El supuesto asesino de Susqueda pensaba huir a Colombia



MEDIASET *española.*


TELECINCO

cuatro

FACTORIA DE FICCIÓN

BOING

Energy

divinity

DE FICCIÓN

EL TIEMPO HOY

mitel

mtmad

YASSS

radioset

telemanía

TELECINCO CINE 2

12. MESES

Atlas

PUBLICIESPAÑA