

GESTIÓN

La subnotificación de la TB afecta al 14,4% de casos

Conclusiones de un estudio multicéntrico entre especialistas de Neumosur y en el que han participado hospitales de diversas comunidades autónomas

MADRID
ROSALIA SIERRA
 rsierra@diariomedico.com

La subnotificación de los casos de tuberculosis, además de complicar el control de la enfermedad, dificulta la localización de contactos y altera la exactitud de los datos epidemiológicos, incluyendo la carga de enfermedad.

Un estudio multicéntrico en el que han participado especialistas de Neumosur, la sociedad científica que reúne a los neumólogos y cirujanos torácicos del sur de España, ha detectado que el 14,4 por ciento de los casos diagnosticados de tuberculosis en 16 hospitales españoles no fueron notificados a los servicios de salud pública, alcanzando un 45 por ciento en algunos centros, cifra que resulta demasiado elevada teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria.

Se trata del primer estudio de España de la declaración de la tuberculosis que ha incluido hospitales de diversas comunidades autónomas.

Para este estudio observacional retrospectivo, que se ha llevado a cabo dentro del Programa Integrado de

Tuberculosis (Pitb) de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio (Separ), se han incluido 592 casos diagnosticados de tuberculosis en 16 centros durante los años 2011-2012, a partir de los registros de Microbiología y Anatomía Patológica y de los servicios de Documentación Clínica (altas hospitalarias), comprobando la notificación de cada caso a los servicios de salud pública y analizando qué factores se asociaban a la no notificación.

En palabras de la investigadora principal del estudio, Concepción Morales, del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada, "hemos determinado las variables demográficas, microbiológicas y clínicas que se asociaban a los casos no notificados".

Los resultados han revelado que 85 casos (14,4 por ciento) no habían sido notificados, oscilando entre el 0 y el 45,2 por ciento según los centros; predominaban los casos con baciloscopia negativa, la enfermedad extrapulmonar y los pacientes jubilados. Los centros que notificaron todos sus casos disponían de enfermera gestora de casos, encargada



Concepción Morales.

de ayudar en la recogida de datos, seguimiento del paciente, localización de contactos y notificación al servicio de salud pública correspondiente. El porcentaje de casos no notificados entre los pacientes con tuberculosis bacilífera fue el 9,4 por ciento y el 19,4 por ciento de los no bacilíferos.

INFRADIAGNÓSTICO

La tuberculosis puede presentarse con síntomas poco específicos, como tos y expectoración de semanas de duración, en pacientes de edad avanzada con comorbilidad asociada, pudiendo pasar desapercibida. Por otra parte, gran parte de la población general piensa que esta enfermedad per-

tenece al pasado y que está erradicada.

Se ha publicado una mayor infradeclaración en pacientes de más edad y en los casos sin confirmación bacteriológica, así como en aquellos con radiografía de tórax no cavitada y en los casos autóctonos.

Por otra parte, la jubilación se asoció con un mayor riesgo de subnotificación, incluso independientemente de la edad, lo que podría ser debido a mayor comorbilidad y motivos de ingreso diversos que podrían ocultar el diagnóstico y notificación de la tuberculosis.

Asimismo, "hemos encontrado que se notifican menos los casos extrapulmonares y casos con baciloscopia negativa en los que el diagnóstico es menos inmediato, quizá porque se piensa que son menos contagiosos. Sin embargo, su notificación es importante para identificar rápidamente a los afectados reduciendo la transmisión, conocer la incidencia exacta e identificar el caso índice", ha afirmado la experta.

Los casos con baciloscopia positiva son más contagiosos y su declaración y el estudio de los contactos es crucial.