

Descubre los secretos que te permitirán operar 40000€ con solo 100€ de inversión



DESTACAMOS

Marcelo y su reacción en el vestuario del Real Madrid al ver el llanto de

Neumólogos y cirujanos torácicos reclaman a las administraciones que financien los tratamientos para dejar de fumar

29/05/2016 - 20:01

Más noticias sobre: [GASTO SANITARIO](#) [TABACO](#) [AUSTRALIA](#) [PIB](#) [FRANCIA](#) [REINO UNIDO](#)

ENLACES RELACIONADOS

▀ [La recesión en EEUU asoma la cabeza: las probabilidades llegan a su nivel más alto en seis años \(4/02\)](#)

▀ [La recesión en EEUU asoma la cabeza: las probabilidades llegan a su nivel más alto en seis años \(4/02\)](#)

Según ha informado Neumosur en una nota, "al menos el 85 por ciento de las personas que sufren EPOC padecen esta enfermedad por haber sido fumadores, y se calcula que incluso entre un 40 y un 50 por ciento de los afectados aún continúan fumando" "Con un tratamiento adecuado podrían contrarrestar la fuerte adicción que mantienen y cesar el hábito tabáquico, aunque para conseguirlo

sería esencial contar con la financiación de ese tratamiento por parte de las administraciones sanitarias", ha indicado el doctor Marcos García, coordinador del grupo de Tabaquismo de Neumosur.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La sociedad científica que aglutina a los neumólogos y cirujanos torácicos del sur de España (Neumosur) ha reclamado a las fuerzas políticas y a las administraciones públicas la financiación de tratamientos farmacológicos para dejar de fumar, sobre todo entre los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología provocada fundamentalmente a consecuencia del tabaquismo. Esta sociedad científica realiza esta petición en la víspera del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el día 31 de mayo.

En esta misma línea, García ha señalado que estudios recientes han constatado que "si se financiara el tratamiento de deshabituación tabáquica, los beneficios para el Sistema Nacional de Salud y los servicios sanitarios de las comunidades autónomas se evidenciarían al cuarto año de su comienzo y supondría un ahorro de más de cuatro millones de euros a los cinco años".

Alrededor de 29 problemas de salud están asociados al tabaco, entre los que ha destacado también el doctor el cáncer de pulmón, que "en el 85 por ciento de los casos es debido al hábito tabáquico. Todos ellos provocan un gasto sanitario y social del 1,7 por ciento del PIB, casi el doble de los impuestos que recauda el Estado por esta droga. En el caso del EPOC, los costes sociales, laborales y sanitarios suponen 2.400 millones de euros al año".

El coste sanitario medio generado por cada paciente se ha estimado en 1.752 euros al año, de los cuales más del 80 por ciento corresponden a gastos hospitalarios y fármacos. Se calcula que el gasto sanitario medio que supone un individuo desde el momento en que se le diagnostica la enfermedad, alrededor de los 50 años, hasta el final de su vida asciende, según estimaciones conservadoras, a unos 30.050 euros, sin tener en cuenta la importante repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

"Desde Neumosur mantenemos la reclamación histórica de destinar los ingresos fiscales asociados a la compra de cajetillas a promover intervenciones efectivas para el control del tabaquismo y programas de prevención en colectivos especialmente sensibles como los jóvenes, así como a sufragar los tratamientos de probada eficacia disponibles para dejar de fumar", ha matizado el presidente de esta sociedad científica, el doctor Aurelio Arnedillo.

CAJETILLAS

Esta petición está estrechamente ligada a otra que ha tomado visos de actualidad en estos días tras la entrada en vigor del nuevo diseño de las cajetillas de tabaco, que desde el pasado día 20 de mayo han visto duplicado el espacio para las imágenes y mensajes de sensibilización contra el tabaquismo. Para Neumosur esta medida es "insuficiente", y la solución para reducir el consumo de tabaco, sobre todo entre los más jóvenes, "pasa por implantar un empaquetado genérico que carezca de marcas", ha apuntado el doctor Marcos García.

Estudios recientes elaborados en Australia, primer país del mundo que adoptó en 2012 esta fórmula de una cajetilla neutra, carente de atractivo visual, manifiestan que en tres años el consumo de tabaco ha descendido del 15,1 al 12,8 por ciento, lo que ha motivado que países como Irlanda, Reino Unido o Hungría hayan decidido instaurar la misma medida en estos últimos dos años, a la que se ha sumado Francia en este mes de mayo.

Con esta petición, Neumosur se suma a la propuesta realizada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y por el Comité Nacional para la Prevención y Tratamiento del Tabaquismo (CNTP) al Gobierno de implantar en España el conocido como 'plain packaging', medida amparada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Está constatado que los paquetes de tabaco genéricos, que carecen del atractivo que puedan otorgarle un determinado diseño, captan menos fumadores nuevos. A ello se debe sumar que las advertencias sanitarias en estos envoltorios más sobrios generan un impacto mayor entre los consumidores", ha añadido el doctor Arnedillo.

La implantación de este empaquetado genérico debe ir acompañada de una política que evite el aumento del contrabando de tabaco, una problemática que ha cobrado "especial importancia" en Australia tras la implantación del paquete neutro y que en España ya "azota" de manera destacada a Andalucía, donde recientemente han sido desarticuladas varias redes de distribución y venta de cajetillas ilegales.

Andalucía es precisamente una de las comunidades autónomas españolas con una prevalencia de tabaquismo "más elevada". En concreto, el consumo de tabaco en Andalucía, según las últimas cifras disponibles, se sitúa actualmente por encima del 27 por ciento con un "preocupante" pico máximo de prevalencia en el grupo poblacional entre 25 y 44 años. Asimismo, es reseñable el notable aumento de las adolescentes fumadoras, contando España con una de las tasas más altas del continente, por encima del 30 por ciento, según explican desde Neumosur.